

TDA/H selon le DSM

Exemples illustratifs et non exhaustifs

Critères diagnostiques

Un mode persistant d'inattention et/ou d'hyperactivité-impulsivité avec retentissement sur le fonctionnement ou le développement, caractérisé par (1) et/ou (2) 11se référer à la DIVA

Inattention
Règle : > 6 mois - 5 symptômes

Hyperactivité et impulsivité
Règle : > 6 mois - 5 symptômes

Ce n'est pas
comportement opposant
comportement provocateur
comportement hostile
incompréhension des tâches ou instructions

Début des troubles avant 12 ans

Au moins deux contextes différents (maison, école...)

Retentissement fonctionnel

Symptômes persistants au-delà d'un trouble psychiatrique

Caractéristiques diagnostiques

Inattention

Distractibilité
Manque de persévérance
Attention non soutenue
Désorganisation

Hyperactivité

activité motrice excessive inappropriée
agitation extrême/épuisant pour autrui

Impulsivité

Actions précipitées préjudiciables
Récompense immédiate

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Retard modéré de langage / motricité / développement social ^{NS}
Faible tolérance à la frustration, de l'irritabilité ou une labilité de l'humeur
Travail scolaire ou performances au travail souvent altérés
Risque accru de tentative de suicide => comorbidité avec des troubles de l'humeur, des conduites ou de l'usage de substances
Réduction de l'inhibition comportementale, au besoin de fournir une grande énergie pour se contrôler ou se contenir, à une émotivité négative et/ou un besoin élevé de recherche de nouveauté
Les troubles visuels et de l'audition, les anomalies métaboliques, les troubles du sommeil, les déficits nutritionnels et l'épilepsie peuvent influencer les symptômes de TDAH.